

Vbeam による治療 説明・同意書

血液中のヘモグロビンに吸収されるレーザー光を照射することで、皮膚や周辺の組織にダメージを与えることなく、赤みを伴う皮膚の様々な悩みに効果が期待できます。症状により照射方法や効果には個人差があり、必要となる治療回数も異なりますが、繰り返していただくことで徐々に改善していきます。

- 照射時には輪ゴムではじかれるような痛みがあり、照射後、軽度の熱感やひりつきを感じる場合があります。
- レーザー照射後、一時的に赤み、腫れ、水泡などのやけど、炎症後色素沈着、内出血による紫斑形成等を伴う場合があります。照射強度は希望により調整しますが、内出血は個人差があり予想以上に強く出る場合があります、数日～2週間程度（個人差あり）吸収され目立たなくなります。
- レーザー照射後は日常的なスキンケアを行い、保湿を十分におこなってください。また治療期間中は低刺激の日焼け止めの使用等により紫外線対策を十分に行ったうえで、日焼けは避けてください。肌へのマッサージやピーリング等は避けてください
- 妊娠中の方、光線過敏症（SLE等）の方、治療部位に傷や悪性腫瘍を含む皮膚腫瘍がある方、出血性疾患がある方、抗凝固剤を内服中の方、直近の過度な日焼けがある方は治療を控えていただく場合があります。
- 内服中のお薬や既往歴については事前にお申し出ください。

私は上記内容を理解し、施術に同意します。

○本人(20歳未満の場合は法定代理人欄の両方に署名が必要です)

令和 年 月 日 氏名

○法定代理人(親権者・後見人・保護義務者)あるいは保証人

令和 年 月 日 氏名

(続柄)

たかはし形成外科美容外科 松原院